



Jellinek-PTSD Screening Questionnaire

Naam	Datum:.....
Voornaam	
Geboortedatum	

Mensen kunnen in hun kindertijd of als volwassene beangstigende, verschrikkelijke of schokkende gebeurtenissen meemaken, bijvoorbeeld (het zien van) een bedreiging, aanranding, seksueel misbruik, mishandeling een ernstig ongeluk of een ramp. Heeft u zelf ooit een dergelijke traumatische gebeurtenis meegemaakt, of bent u daarvan getuige geweest?

JA (vul onderstaande in)

NEE (einde vragenlijst)

Bedreiging

Verkrachting/aanranding

Mishandeling/geweld

Seksueel misbruik

Ernstig ongeluk

Oorlog

Ramp

Anders, namelijk.....
.....

Heeft U in de laatste maand ... (omcirkel het juiste antwoord):

1. Nachtmerries over de gebeurtenis gehad of moest u er aan denken, terwijl U dat niet wilde?	Ja	Nee
2. Uw uiterste best gedaan er niet aan te denken, of situaties vermeden die U daaraan herinnerde?	Ja	Nee
3. Het gevoel gehad dat U voortdurend op uw hoede was, waakzaam, of erg schrikachtig?	Ja	Nee
4. Het gevoel gehad dat uw toekomstplannen of verlangens de grond in geboord zijn ten gevolge van die gebeurtenis?	Ja	Nee

De Jellinek-PTSD Screening Questionnaire is ontwikkeld door Jellinek in samenwerking met de afdeling Klinische Psychologie van de Universiteit van Amsterdam. De screener is vrij te gebruiken met bronvermelding. Het is niet toegestaan om de screener aan te passen of te veranderen zonder voorafgaande toestemming van de auteurs (contactpersoon: debora.van.dam@jellinek.nl).



Toelichting op de Jellinek-PTSD Screening Questionnaire

Verslavingsproblematiek en PTSS komen relatief vaak samen voor. Uit onderzoek binnen Jellinek blijkt dat bij 20% van de cliënten die zich aanmelden voor een verslavingsbehandeling er ook sprake is van PTSS.

De screener is ontwikkeld om op een snelle en efficiënte wijze PTSS op te sporen gedurende de intake-fase binnen de verslavingszorg, om vervolgens cliënten toe te leiden naar een gerichte behandeling voor zowel hun verslaving als PTSS.

De score op de screener wordt verkregen door de met 'ja' beantwoorde vragen bij elkaar op te tellen. Bij een score 2 of hoger is de screener positief. In dat geval is er mogelijk sprake van PTSS. Bij een positieve screener is het raadzaam vervolgdagnostiek te verrichten om uitsluitsel te verkrijgen of er daadwerkelijk sprake is van een diagnose PTSS. Geadviseerd wordt om hierbij gebruik te maken van een gestandaardiseerd instrument zoals bijvoorbeeld het Structural Clinical Interview for DSM-IV Axis-I Disorders (SCID-I).

Voor meer informatie over de ontwikkeling van deze screener

Van Dam, D., Ehring, T., Vedel, E. & Emmelkamp, P.M.G. (2012). Screening for PTSD in civilian substance use disorder patients: Cross-validation of the Jellinek-PTSD screening questionnaire. *Journal of Substance Abuse Treatment (in press)*.

Van Dam, D., Ehring, T., Vedel, E. & Emmelkamp, P.M.G. (2010). Validation of the PC-PTSD screening questionnaire in civilian substance use disorder patients. *Journal of Substance Abuse Treatment*, 39, 105-113.